Child Safety Checklist

Keep your home safe for babies and children. Share this checklist with anyone who cares for your child. **Keep emergency phone numbers**, **such as doctor**, **fire department**, **poison control** (1-800-222-1222) and 911, close to the phone. Teach your older children how and when to call 911 or other emergency phone numbers.

Watch Your Child Closely			
☐ Never leave your baby or young child alone:			
► at home			
► in a bathtub			
▶ in a car, even when your child is sleeping			
 on a raised surface such as a bed, changing table or sofa 			
☐ Do not leave your baby or young child alone with other children or pets.			
Safety with Baby Care			
☐ Do not let anyone drink hot liquids or smoke while holding your baby.			
☐ Place your baby on his or her back every time to sleep.			
☐ Do not lay your baby on a waterbed, pillow or other soft surface that could suffocate him or her.			
☐ Never prop a bottle during a feeding.			
Clothing Safety			
☐ Remove drawstrings in clothing.			
☐ Use flame retardant sleepers and pajamas.			
☐ Do not put necklaces, rings or bracelets on babies.			

قائمة الإجراءات الوقائية الخاصة بالأطفال

حافظي على سلامة منزلك وتهيئته للرضع والأطفال شاركي هذه القائمة مع من يهتم بطفلك احتفظي بأ قام الطهار على مثل وقم الطبيب والله قرالاطفاء ممكافحة المدوم (222 222 200 1) وقد

بارقام الطوارئ مثل رقم الطبيب وإدارة الإطفاء ومكافحة السموم (1222-222-1800-1) ورقم 911 بجوار الهاتف . دربي أطفالك الأكبر سنًا على كيفية الاتصال برقم 911 أو أي رقم من أرقام الطوارئ الأخرى.
راقبي طفلك عن كثب
□ لا تتركي طفلك الرضيع أو الصغير بمفرده:
◄ في المنزل
◄ في حوض الاستحمام
◄ في السيارة، حتى عندما يكون نائمًا
◄ على سطح مرتفع مثل سرير أو منضدة متحركة أو أريكة
□ لا تتركي الرضيع أو طفلك الصغير بمفرده أو مع غيره من الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
قواعد السلامة عند العناية بالطفل
□ لا تسمحي لأحد بالتدخين أو شرب السوائل الساخنة و هو يحمل طفاك.
🗖 احرصي على وضع الطفل على ظهره لينام.
□ لا تضعي الطفل على سرير مزود بمرتبة مائية أو وسادة أو أي سطح لين آخر لأن ذلك قد يؤدى إلى اختناق الطفل.
□ لا ترفعي الزجاج أثناء إرضاع الطفل.
الاحدامات المقائدة المتعاقة بالتعام المالات
77

الإجراءات الوقائية المتعلقة بارتداء الملابس

- □ احرصي على إزالة الأربطة الخاصة بإحكام الملابس.
- □ استخدمي ملابس النوم والبيجامات المصنوعة من مواد مضادة للاشتعال.
 - □ لا تضعى قلادة أو خاتمًا أو سوارًا للأطفال.

	Never tie a ribbon or cord around your baby's neck to hold a pacifier.		
Νι	ursery and Equipment Safety		
	Buy baby furniture with the Consumer Product Safety Commission (CPSC) or the Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA) label.		
	► Choose a crib with slats no more than 2 3/8 inches apart and railing that measure 26 inches high from the mattress frame. Be sure the adjustable side rail latches securely when up.		
	► Choose playpens that have mesh with less than ¼ inch spaces. Make sure the material is securely attached to the top rail and bottom.		
	Use a crib mattress that fits snugly.		
	Never place pillows, padding, bumpers, toys or other items in your baby's crib. Babies can suffocate on these items.		
	Do not use baby walkers. Each year babies are seriously injured from falls while in walkers.		
Sa	afety in All Rooms of the House		
	Put safety latches on all cabinets and drawers that contain sharp or breakable objects, chemicals or medicines.		
	Put outlet covers on all electrical outlets.		
	Put a baby gate at the top and bottom of all stairways.		
	Cover corners and sharp edges of furniture with corner protectors.		
	Keep items such as electrical cords and plants out of children's reach.		
	Put screens around fire places, hot radiators, stoves, kerosene or space heaters.		
	Lock or latch windows properly. Keep blind and drapery cords wrapped and out of reach to prevent accidental hanging.		

 □ لا تضعي شريطاً أو رباطاً حول عنق الطفل لتثبيت اللهاية.
الإجراءات الوقائية المتعلقة بحجرة الطفل ومشتملاتها
 □ اشتري الأثاث المعد للأطفال والذي يحمل العلامة الخاصة بلجنة سلامة منتجات المستهلك (CPSC) أو الخاصة باتحاد صانعي منتجات الأطفال (JPMA).
 ◄ اختاري سرير للطفل تكون ألواحه قريبة من بعضها البعض (من5 إلى 8 سم بين كل لوح والآخر) ويكون له حواجز حديدية تعلو عن إطار الفراش بحوالي 65 سم، وتأكدي من تثبيت المزاليج الخاصة بحواجز الفراش الجانبية بإحكام عند رفعها لأعلى.
 ◄ احرصي على اختيار مكان للعب الأطفال مزود بشبكة تقل مساحة الفتحات فيها عن 1/4 بوصنة، تأكدي من إحكام تثبيت الشبكة إلى أعلى وأسفل الحواجز.
 □ استخدمي مرتبة مناسبة لحجم الفراش المخصص للطفل.
 □ لا تضعي وسائد، مساند، مصدات, لعب أطفال أو غيرها في سرير طفلك، حيث يمكن لهذه الأشياء أن تتسبب في اختناق طفلك.
□ تجنبي استخدام مشايات الأطفال، حيث يصاب عدد كبير من الأطفال بجروح خطيرة سنويًا بسبب السقوط أثناء استخدام المشاية.
الإجراءات الوقائية الخاصة بكل غرف المنزل
□ ضعي مزاليج لضمان الأمان على جميع الخزائن والأدراج التي تحتوي مواد حادة أو قابلة للكسر أو كيماويات أو أدوية.
 □ غطي جميع مخارج التيار الكهربي بالأغطية المخصصة لذلك.
 ضعي البوابات التي تحول دون مرور الطفل أعلى جميع السلالم و أسفلها
 □ غطي زوايا الأثاثات وحوافه الحادة بواقيات الزوايا .
□ احتفظي بالأسلاك الكهربائية والنباتات بعيدًا عن متناول الأطفال.
 ضعي حواجز حول المواقد أو أجهزة التسخين أو مدافئ الكيروسين أو المدافئ الأخرى.
□ أغلقي النوافذ جيدًا، وحافظي على أحبال الستائر أو الأقمشة ملفوفة وبعيدة عن متناول الأطفال لمنع التفافها حول عنق الطفل.

K	itchen Safety		
	Keep hot drinks and foods, knives, cleaning products, plastic bags, and electrical objects out of children's reach.		
	Keep pot handles facing inward on the stove.		
	Choose a high chair with a wide sturdy base and a tray table that attaches to both sides. Use the safety strap to hold your baby securely in the chair. Keep t chair away from the stove, windows and counters where unsafe items can be pulled off.		
W	ater Safety		
	Adjust the temperature on the water heater to 120 degrees Fahrenheit or less.		
	Check that the bath water is warm, not hot, before putting your baby or young child in the water. Use only a small amount of water in the bathtub.		
	Use a baby tub for at least the first 5 months. Then use a tub seat when your baby is able to sit without help.		
	Never leave your baby or young child alone in the bathtub, hot tub or backyard pool – even for a second. If the telephone or doorbell rings, ignore is or take your child with you to answer it. Young children can drown very quickly in a small amount of water.		
M	ledicine Safety		
	Store medicines and vitamins out of children's reach in a locked drawer or cabinet.		
	Never give home remedies or medicine to your child without first checking with a doctor.		
	Check with a doctor or pharmacist for the right medicine dose for your child's age or weight.		
To	by Safety		
	Always buy flame resistant, washable, non-toxic toys.		
	Check toys to be sure they are for the right age for your child.		

الإجراءات الوقائية المتعلقة بالمطبخ
 □ احتفظي بالمشروبات والأطعمة الساخنة والسكاكين ومنتجات التنظيف وأكياس البلاستيك والمعدات الكهربية بعيدًا عن متناول الأطفال.
 احرصي على جعل مقابض أو عية الطهي للداخل أثناء وضعها على الموقد.
□ اختاري مقعد مرتفع مع قاعدة واسعة وقوية وصينية طعام مثبتة من الجانبين، واستخدمي حزام الأمان لتثبيت طفلك بإحكام في الكرسي، احتفظي بالكرسي بعيدًا عن النوافذ والموقد والعدادات حيث يمكن سحب أي شيء غير آمن.
الإجراءات الوقائية المتعلقة بالماء
□ اضبطي درجة حرارة سخان الماء على 120 درجة فهرنهايت أو أقل من ذلك.
□ تأكدي من أن ماء الاستحمام دافئ وغير ساخن قبل وضع رضيعك أو طفلك الصغير في الماء، وضعي كمية قليلة من الماء في حوض الاستحمام.
□ استخدمي البانيو المخصص للأطفال في الشهور الخمسة الأولى من عمر الطفل على الأقل. ثـ استخدمي مقعد البانيو عندما يكون طفلك قادرًا على الجلوس دون مساعدة.
□ لا تتركي الرضيع أو طفلك الصغير وحده في البانيو أو حوض الاستحمام الساخن أو حما السباحة المنزلي - ولو لثانية، إذا رن جرس الهاتف أو جرس الباب، تجاهليه أو خذي طفلا معك للإجابة عليه، فقد يغرق الأطفال الصغار في القليل من الماء.
الإجراءات الوقائية المتعلقة بالدواء
 □ خزني الأدوية والفيتامينات بعيدًا عن الأطفال في درج أو خزنة مقفلة.
 □ لا تعطي الطفل أي وصفة منزلية أو دواء دون استشارة الطبيب.
 □ استفسري من الطبيب أو الصيدلي عن الجرعة الدوائية المناسبة لعمر طفلك أو وزنه.
الإجراءات الوقاية المتعلقة بالألعاب
□ اشتري الألعاب المضادة للاشتعال والقابلة للغسل وغير المحتوية على مواد سامة.
□ افحصي الألعاب لتتأكدي من ملاءمتها لعمر طفلك.

	Keep small objects, balloons, and plastic bags away from your baby or young child. If objects can fit into a toilet paper roll, they are too small for your baby or young child.
	Teach your child to wear a bike helmet when using a bike, scooter, skateboard and other wheeled toys. Helmets reduce the risk of serious head injury.
C	ar Safety
	Always use approved child safety seats for your child's age and weight. Place babies in a rear-facing seat until 2 years old or until they reach the highest height and weight allowed by the manufacturer – usually about 35 pounds.
	Install safety seats in the back car seat.
	Check with your local children's hospital, health department or fire department to have someone check that the seat is in the car the right way.
	Never hold a baby or child on your lap while riding in a car or truck.
	Everyone in the car should wear a seat belt.
Fi	re Prevention
	Keep matches and lighters out of your child's reach.
	Install smoke alarms on every floor of your home. Be sure to place alarms near rooms where you and your children sleep.
	Check smoke alarm batteries each month and change them every six months.
	Plan more than one escape route from each room in the house and pick a place for everyone to meet outside. Practice this plan with your children.
	Teach your child about fire safety.

□ احتفظي بالأشياء الصغيرة والبالونات والأكياس البلاستيكية بعيدًا عن رضيعك أو طفلك الصغير، إذا أمكن إدخال الأشياء في التجويف الموجود ببكرة ورق الحمام، فهي صغيرة جدًا ولا ينبغي تركها للرضيع أو الطفل الصغير.
□ علمي طفلك ارتداء الخوذة عند استخدام الدراجة أو السكوتر أو لوح التزلج أو أي ألعاب أخرى بعجلات، كما تحد الخوذات من خطر إصابات الرأس الخطيرة.
الإجراءات الوقائية المتعلقة بالسيارة
□ احرصي على استخدام مقاعد سلامة الطفل المرخصة والملائمة لعمر طفلك ووزنه. ضعي طفلك في المقعد الخلفي حتى يصل لعمر عامين أو حتى يصل للوزن والطول المسموح بهما من قبل الجهة المصنعة، وهو ما يساوي عادة 35 رطلاً.
🗖 ثبتي مقاعد السلامة فوق المقعد الخلفي للسيارة.
 □ تحدثي إلى مستشفى الأطفال المحلية أو قسم الصحة أو قسم الحريق لإرسال من يقوم بفحص المقعد والتأكد من وضعه في المكان الصحيح.
□ تجنبي حمل الرضيع أو الطفل على حجرك أثناء ركوب السيارة أو الشاحنة.
□ ينبغي على جميع من في السيارة ارتداء حزام الأمان.
الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحريق
□ احتفظي بأعواد الثقاب والقداحات بعيداً عن متناول الأطفال.
□ ركبي أجهزة إنذار الحريق في كل طابق من طوابق منزلك، وتأكدي من وضعها بالقرب من غرفة نومك وغرفة نوم الأطفال.
 □ افحصي بطاريات جهاز الإنذار شهريًا وغيريها كل ستة أشهر.
 □ صممي منزاك بحيث تضم كل غرفة أكثر من طريق هروب واحد، واختاري مكان الجميع للالتقاء في الخارج، تدربي على خطة الهروب مع أطفالك.
□ علمي أطفالك احر اءات الوقاية من الحر ائق

U	tner Safety Measures
	Carbon monoxide (CO) is a colorless, odorless gas that can kill. Install a CO detector on each floor of your home. CO comes from unvented space heaters, blocked chimneys, leaking furnaces, gas water heaters, wood or gas stoves, gasoline powered equipment such as generators and car exhaust from attached garages.
	Contact your local health department to learn about lead poisoning dangers if you live in a home or use a daycare that was built before 1978. Painted toys of furniture that are older or come from another country may also have lead in them. Children under 6 years old are at the most risk for lead poisoning.
	Keep guns and other firearms out of your home. If they must be in the home, unload them and put them in a locked place. Keep the keys out of children's reach. Store the gun in a separate place from the bullets.
	Consider taking an infant/child CPR course and first aid class.
	Teach your child how to cross the street safely.
	Put sunscreen on your child. Put a hat on babies less than 6 months old.

Talk to your children's doctor or nurse if you have any questions or concerns about their safety.

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. Wexner Medical Center at The Ohio State University, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

الأخرى	السلامة	ندابير
--------	---------	--------

- □ أول أكسيد الكربون (CO) هو غاز عديم اللون والرائحة ويمكنه أن يقتل، لذا يوصى بتركيب جهاز للكشف عن وجود أول أكسيد الكربون في كل طابق من منزلك، ويأتي أول أكسيد الكربون من المدافئ سيئة التهوية والمداخن المغلقة والأفران المسربة وسخانات المياه التي تعمل بالغاز ومواقد الخشب أو المغاز، والمعدات التي تعمل بالبنزين مثل المولدات وعوادم السيارات المنبعثة من المرآب.
- □ اتصلي بالإدارة الصحية المحلية لمعرفة المزيد عن مخاطر التسمم بالرصاص إذا كنتِ تعيشين في منزل أو تستخدمين وسائل الرعاية النهارية التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1978، كما قد تحتوي الألعاب الملونة أو قطع الأثاث القديمة أو المستوردة على مادة الرصاص، ويعد الأطفال دون سن 6 سنوات الأكثر عرضة للتسمم بالرصاص.
- □ احتفظي بالبنادق والأسلحة النارية الأخرى بعيدًا عن منزلك، وإذا كانت هناك ضرورة لوجودها في المنزل، أفرغي الطلقات منها ثم ضعيها في مكان مغلق، واحتفظي بالمفاتيح بعيدًا عن متناول الأطفال، كما ينصح بحفظ الأسلحة في مكان منفصل بعيدًا عن الطلقات.
 - فكري في الالتحاق بدورة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ودورة في الإسعافات الأولية.
 - □ علمي طفلك كيفية عبور الشارع بأمان.
 - □ ضعي الكريم الواقي من الشمس على جلد طفلك، وضعي قبعة على رأس الأطفال الرضع الأقل من 6 أشهر.

تحدث إلى طبيب أطفالك أو الممرضة إذا كان لديك أية استفسارات أو تساؤلات.

2006 – 1/2012 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. Wexner Medical Center at The Ohio State University, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.