

Žene: Neke žene mogu imati neuredan Pap test, koji je uradjen tokom godišnjeg zdravstvenog pregleda. Kako je mogu e da se spolne bradavice pojave na grli u maternice, važno je da žene idu redovno na zdravstvene preglede.

Lije enje:

Ne postoji lijek za HPV infekciju. Spolne bradavice mogu biti uklonjene od strane doktora ili mogu same od sebe nestati, ili, HPV može ostati i postati opasan. Vrlo je važno da idete na godišnje preglede i da kontrolirate svoje zdravlje.

Sprije avanje:

HPV, kao i ostale spolno prenosive bolesti, se može sprije iti tako što ne ete imati seks ili tako što ete imati seks sa nekim tko nije zaražen i tko ima seks samo sa vama. Kondomi ne sprije avaju širenje HPV..

SIFILIS

Sifilis je seksualno prenosiva bolest koju uzrokuje bakterija. Sifilis se prenosi sa osobe na osobu kroz direktni kontakt sa sifilis ranom.

Znakovi/Simptomi:

Sifilis ima mnogo znakova i simptoma koji esto sli e drugoj bolesti. Sifilis ima tri faze.

Faza 1: Prvi znaci sifilisa se ina e pojave izmedju 10 i 90 dana od zaraze. Sifilis uzrokuje ranu. Ako se ne lijeci, Sifilis e se pogoršati.

Faza 2: Bolest uzrokuje osip na jednom ili na više dijelova tijela. Osip ne svrbi. Ako se ne lije i, bolest se pogorša.

Kasna faza: Vanjski simpotmi nestanu, ali

zaražena osoba po inje doživljavati gubitak osjecaja, smanjivanje mentalne sposobnosti, ili nesposobnost micanja nekih dijelova tijela. Ako se ne lijeci, sifilis može uzrokovati smrt.

Lije enje:

U ranim fazama, Sifilis se lako izlije i. Ne postoje lijekovi koje možete kupiti u apoteci ili neki ku ni lijek koji e uništiti bakteriju koja uzrokuje Sifilis, ali ljekar može propisati lijek koji e izlije iti Sifilis u ranim fazama. Lije enje e izlije iti bolest, ali ne e popraviti štetu koju je bolest napravila.

Sprije avanje:

Sifilis se može sprije iti. Kao i ostale spolno prenosive bolesti, Sifilis se može sprije iti tako što ne ete imati seks ili tako sto ete imati seks sa nekim tko nije zaražen i tko ima seks samo sa vama. Kondomi ne sprije avaju širenje Sifilisa.

Za zdravstvene informacije na internetu, pogledajte:

Body Health Resources Corporation
www.thebody.com

American Social Health Association
www.iwannknow.org
and www.ashstd.org

The Centers for Disease Control National
Prevention Information Network
www.cdcnpin.org

Za zdravstvene informacije putem telefona:

1-800-227-8922

CDC National STD Hotline
24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

1-800-342-AIDS (1-800-342-2437)

CDC National AIDS Hotline
24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

1-800-994-9662

National Women's Health Information Center
U.S. Department of Health
and Human Services

Informacije za ovu brosuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Body Health Resources Corporation

The American Social Health Association

Ova brosuru je napravljena uz finansisku pomoc Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za Izbjeglice i Raseljena lica.

CONTACT INFORMATION:

riht@uscridc.org
U.S. Committee for Refugees and Immigrants
1717 Massachusetts Ave., NW
Suite 200
Washington, DC 20036
Phone: 202 • 347 • 3507
Fax: 202 • 347 • 7177
www.refugees.org



Šta bi statko trebao da zna o seksualno prenosivim bolestima (STDs) (STDs-Bosnian)



www.refugees.org
*Protecting Refugees, Serving Immigrants,
Upholding Freedom since 1911*

KLAMIDIJA

Klamidija je izljuje iva, spolno prenosiva bolest(STD). Klamidija se može prenijeti sa jedne osobe na drugu tokom direktnog seksualnog odnosa. Klamidija se također može prenijeti sa zaražene majke na bebu tokom prirodnog (vaginalnog) poroaja. Seksualno aktivni muškarci i žene, posebno oni izme u 20 i 30 godina starosti, bi trebalo da se testiraju da provjere da li imaju Klamidiju. Klamidija može ozbiljno oštetiti reproduktivni sistem kod oba spola i može dovesti do neplodnosti, odnosno nesposobnosti da se zatrudni ako se ne lije i,

Znakovi/Simptomi:

Žene: Vecina žena nema simptome. Ako su prisutni, simptomi su blagi.

Muškarci: Muškarci nemaju simptome. Ako su simptomi prisutni, uobicajeno su blagi.

Neki muškarci mogu imati iscjedak iz penisa (muški spolni organ).

Lijecenje:

Klamidija se može lije iti sa antibioticima. Sve seksualne partnere zaražene osobe bi trebalo da tretira ljekar.

Sprijecavanje:

- Uzdržavanje od seksa (nemati seks)
- Nemati seks sa zaraženom osobom
- Pravilno i konstantno koristiti gumene kondome (muske i zenske) i zubne prepreke (zaštita kod oralnog seksa)

GONOREJA

Gonoreja ili kapavac je izljuje iva spolno prenosiva bolest. Gonoreja se prenosi tokom

direktnog seksualnog odnosa. Gonoreja se tako er može prenijeti sa zaražene majke na bebu tokom prirodnog porodjaja. Infekcije gonorejom mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Gonoreja može dovesti do neplodnosti isto kao Klamidija, ako se ne lijeci.

Znakovi/Simptomi:

Žene: Ve ina žena nema simptome. Ako su prisutni, simptomi su blagi:

- Bol ili osje aj pe enja tokom mokrenja
- Neobi an vaginalni iscjedak

Muškarci: Ve ina muškaraca nema simptome. Ako su simptomi prisutni, pojaviti e se dva do pet dana nakon infekcije. Simptomi su:

- Osje aj pe enja tokom mokrenja
- Bijeli, zeleni ili zu kasti iscjedak iz penisa
- Kod nekih muškaraca, nateknuti i bolni testisi

Lije enje:

Gonoreja se može lije iti sa antibioticima.

Sprije avanje:

Uzdržavanje od seksa (apstinirati)

- Nemati seks sa zaraženom osobom
- Pravilno i konstantno koristiti lateks kondome (muške i ženske) i zubne prepreke (zaštita kod oralnog seksa)

HERPES

Herpes je seksualno prenosiva bolest koju uzrokuje virus herpes simpleksa. Može se pojaviti na ustima (oralni herpes ili groznica) ili na podrucju spolnog organa (spolni herpes). Herpes se može prenijeti kroz direktni kontakt kože. Herpes je vrlo uobicajen; ve ina osoba ne zna da ga ima,

ili pogrešno protuma e simptome kao neku drugu zarazu. Ne postoji lijek za herpes.

Znakovi/Simptomi:

- Tipi ni Herpes je mali grozd kvržica koje vremenom okore i okrastave kao posjekotina.
- Osoba može imati znakove Herpesa sedmicama, mjesecima ili godinama nakon infekcije.
- Dosta ljudi nemaju simptome ili imaju vrlo blage simptome, koji se pogrešno protuma e kao druga bolest.

Lije enje:

Nema lijeka za Herpes. Ne postoji tretman koji može sprije iti Herpes.

Sprijecavanje:

Suzdržavanje od seksa (apstinencija) je uvijek preporucljivo. Medjutim, cak i one osobe koje nisu seksualno aktivne mogu biti nosioci virusa herpes simpleksa i mogu ga prenijeti na druge

HIV/AIDS

HIV (Virus opadanja sposobnosti odbrambenog sistema organizma) je virus koji uzrokujeSIDU (Sindrom ste enog imunološkog deficita). HIV je bolest koja se prenosi kontaktom sa krvi, sjemenom, vaginalnom sluzi ili mlijekom iz dojki zaražene osobe. HIV se lako može sprije iti. Osobe bez simptoma ili znakova bolesti mogu prenijeti HIV na druge.

Znakovi/Simptomi:

- Osoba može da godinama nema znakove koji e pokazati da je zaražena sa HIV.
- Ne možete pogledati u nekoga i znati da li je on ili ona zaražen sa HIV.

- Jedini na in da se sazna zasigurno da li netko ima HIV je da bude testiran na HIV.

Lije enje:

Ne postoji lijek za HIV ali postoji lije enje. Sa pravilnom zdravstvenom njegom, lijekovima i ishranom, osoba sa HIV može zivjeti dug i zdrav zivot. Trudnice sa HIV bi trebale dobiti pred porodjajnu njegu i lije enje da bi se sprije ilo širenje HIV na njihove bebe.

Sprije avanje:

HIV se može sprije iti. Sprijecite HIV tako što cete se:

- Uzdržavati od seksa (apstinirati)
- Nemati seks sa zaraženom osobom
- Pravilno i konstantno koristiti lateks kondome (muške i ženske) i zubne prepreke (zaštita kod oralnog seksa)

HPV (HUMANI PAPILOMA VIRUS) ILI spolne bradavice

HPV je grupa virusa koje se mogu prenijeti sa jedne osobe na drugu tokom seksa. HPV može dovesti do raka grli a maternice, što može biti po život opasna bolest. HPV može uzrokovati spolne bradavice. Spolne bradavice se mogu na i na grli u maternice, u podru ju vanjskog dijela spolnog organa, u vagini, rektumu ili penisu.

Znakovi/Simptomi:

- Vecina osoba sa HPV nemaju simptome.
- U nekim slu ajevima, HPV uzrokuje spolne bradavice. Spolne bradavice su mesnata, mekana, vlažna nateknu a uobi ajeno u podru ju spolnog organa.

Bradavice se tako er mogu pojaviti na mošnicama, preponama ili na bedrima.